

# Sortiment

## INSULINPENNOR OCH NÅLAR



**SoloSTAR®** Förfylld insulinpenna, 1-80 enheter per injektion, 1 enhets intervall. Lantus vnr: 07 86 23.  
Apidra vnr: 07 86 32.



**CliKSTAR®** Flergångspenna, 1-80 enheter per injektion, 1 enhets intervall. Vnr: 22 05 55 (silver) 22 05 54 (blå)



**JuniorSTAR®** Flergångspenna, 1-30 enheter per injektion, 0,5 enhets intervall. Vnr: 73 40 20 (blå) Vnr: 73 40 21 (silver) Vnr: 73 43 20 (röd)

**Microfine BD** (100 st)

5 mm vnr 246389

8 mm vnr 235473

**Insupen Artsana** (100 st)

6 mm vnr 203758

8 mm vnr 203759

**Penfine Ypsomed**

(100 st)

6 mm vnr 263244

8 mm vnr 263236

**Unifine Pentips Owen Mumford**

(100 st)

6 mm vnr 201901

8 mm vnr 201902


Senaste uppdatering över godkända nålar och mer information hittar du på [www.lantus.se](http://www.lantus.se)

# Doskort Lantus (insulin glargin)

## START/TITRERING

**Rekommenderad startdos:** 10 enheter en gång om dagen. Injicera alltid Lantus vid samma tid på dygnet.<sup>1</sup>

- Titring baseras på patientens FPG-värden.
- Patienten bör mäta sitt fastevärde varje dag.
- Vid tre fastevärden i rad på över 5,6 mmol/l öka dosen med 2 enheter.<sup>2</sup>



\*Initial dos = Rekommenderad startdos är 10 E men individuella behov styr.

## BYTE FRÅN NPH

Vid endos NPH ► ge samma dos Lantus.

Vid tvådos NPH ► minska totaldosen med 20-30% och ge endos Lantus.

**Exempel:** 20 + 20 enheter NPH.

Minska med 20% = 28 enheter Lantus.

Individuell titring till önskat behandlingsmål.

## BYTE FRÅN MIXINSULIN

Räkna ut basinsulindosen. Starta med 80% av uträknad dos i endos Lantus. Resterande insulin ges som måltidsinsulin om behov finns. Titra upp Lantusdosen.

**Exempel:** 20 + 20 enheter mixinsulin 30/70. Räkna ut 70% av totalt 40 enheter = 28 enheter basinsulin. 80% av dessa 28 enheter = 22 enheter Lantus.

## INTENSIFIERA MED BASAL +

**När basinsulin inte räcker till:** Lägg till en dos Apidra till dagens huvudmål om HbA1c ligger för högt trots att FPG-målet uppnåtts (efter att dosen Lantus titrerats upp).<sup>3</sup>



# Doskort Apidra (insulin glulisin)

## START/DOSJUSTERING

**Startdos:** Individuell bedömning eller initialt 2 enheter. Apidra (insulin glulisin) ska ges 0-15 minuter innan eller kort efter måltid.<sup>4</sup>

**Dosjustering:** Dosen kan justeras med ledning av hur plasmaglukos ligger före nästa måltid. Titrera dosen var tredje dag.

Plasmaglukos (mmol/l)	Dosjustering
< 5	-2E
5-7	Fortsätt som tidigare
7-9	+2E
> 9	+4E

**Exempel:** Om PG innan lunch är 8 mmol/l så höjs dosen Apidra vid frukost med 2 enheter.

## BYTE TILL APIDRA

Vid byte till Apidra från annat måltidsinsulin beräknas dosen för Apidra enligt: **1 enhet = 1 enhet**

## MÅLVÄRDE

Individuellt målvärde bestäms i samråd mellan patient och vårdgivare. Nedanstående värde har förslagits som riktvärde av SFD (Svensk Förening för Diabetologi):

**PG preprandiellt < 6 mmol/L**

**PG postprandiellt < 10 mmol/L**

### Referenser:

1. www.fass.se Produktresumé Lantus
2. Davies et al. Diabetes Care 2005;28:1282-1288
3. Lankisch et al. Diabetes, Obesity and Metabolism, 2008;1178-1185
4. www.fass.se Produktresumé Apidra

# Lantus/Apidra

## OMVANDLINGSTABELL FÖR RECEPT

Antal enheter per dag	Antal förpackningar för 3 månaders förbrukning
2 - 16	1
18 - 32	2
34 - 50	3
52 - 66	4
68 - 82	5
84 - 100	6

## VARUNUMMER INSULINER

	Lantus	Apidra
<b>SoloStar</b>	07 86 23	07 86 32
<b>Cylinderampull</b>	09 04 56	01 98 14
<b>10 ml injektionsflaska</b>	08 99 53	01 97 77

**Lantus**<sup>®</sup> (insulin glargin) R<sub>x</sub> F, A10AE04, 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. **Indikation:** Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder. **Varning och försiktighet:** Lantus ska ej användas för behandling av diabetesketoacidosis. **Förpackningar:** Lantus SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. Läs bipacksedeln noggrant. Datum för senaste översyn av produktresumén, september 2016.

*Lantus ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.*

**Apidra**<sup>®</sup> (insulin glulisin) R<sub>x</sub> F, A10AB06, 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en kortverkande insulinanalog. **Indikation:** För behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där behandling med insulin krävs. **Varning och försiktighet:** se [www.fass.se](http://www.fass.se). **Förpackningar:** Apidra SoloStar 5 x 3 ml, cylinderampull 5 x 3 ml, injektionsflaska 10 ml. Läs bipacksedeln noggrant. Datum för senaste översyn av produktresumén, september 2016.

**Kontaktuppgifter:** Våra diabetesläkemedel tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, [www.sanofi.se](http://www.sanofi.se). Vid frågor om våra läkemedel kontakta: [info-avd@sanofi.com](mailto:info-avd@sanofi.com). För vidare information och senaste prisuppgift se [www.fass.se](http://www.fass.se).

För mer information  
om diabetes och diabetesbehandling  
gå in på [www.lantus.se](http://www.lantus.se)