

DOSERINGSKORT

Namn: _____

Datum: _____

Läk/Sköt: _____

Telefon: _____

Tablett/Insulin	Frukost	Lunch	Middag	Kväll

Mål för fasteblodssocker _____ mmol/l


Öka Toujeodosen med _____ enheter var tredje dag tills målet nås.¹

Referens: 1. www.fass.se Produktresumé Toujeo

Toujeo är ett basinsulin som ska administreras en gång dagligen och kan ges när som helst under dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag.

Vid behov kan Toujeo administreras upp till 3 timmar före eller efter den vanliga tiden för dosering.

- Titring baseras på dina FPG-värden
- Du bör mäta ditt fastevärde varje dag
- Höj inte dosen oftare än var 3-4 dag



Anteckningar: _____



Toujeo® (insulin glargin) R, F.A10AE04, 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. **Indikation:** Behandling av diabetes mellitus hos vuxna. **Varning och försiktighet:** Toujeo skall ej användas för behandling av diabetesketoacidosis. För ytterligare information se www.fass.se. **Förpackningar:** Toujeo SoloStar 5x1,5 ml. Läs bipacksedeln noggrant. **Prisuppgift:** se www.fass.se. Toujeo tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén, september 2016. Toujeo ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Dosregimen för Toujeo® (dos och tidpunkt) ska anpassas individuellt. I kliniska studier har man efter initiering sett att för det med styrkan på 300 enheter/ml krävs i genomsnitt en 10-18% högre insulinindos för att uppnå motsvande glukoskontroll som med 100 enheter/ml. SASE.TJO.16.05.0179, maj 2016.

Frågor om våra insulinpennor:

020-52 68 87

www.insulin.se

